当院 ICU における早期離床・リハビリテーションの実施状況と問題点について

岡本 竜哉、田根 志帆、伊藤 響、下尾 菜摘、青島 恵美子、谷川 本明
松崎 春希、髙橋 宏幸、三浦 衣よ子、今瀬 謙、山崎 丞一、鈴木 優生
小山 智之、島田 未侑、木村 恵美子、橋口 芽依、廣田 由紀、藤谷 順子
国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 救命救急センター 集中治療科

背景と目的

背景：ICU における救命率が向上する一方、ICU-acquired weakness やせん妄といった、集中治療管理が身体精神機能に及ぼす悪影響が注目され、その対策として ABCDE バンドルや早期離床などの有用性が論じられてひさしい。平成 30 年度の診療報酬改定においては、「ICU における多職種による早期離床・リハビリテーションの取組に係る加算」が新設され、診療報酬面からも支援されるようになった。

方法：そこで、ICU 医師 2 名、集中ケア認定看護師 2 名、専任理学療法士 2 名、リハビリテーション科医師 1 名よりなる早期離床・リハビリテーションチームを組織し、これまで行ってきた床上運動・離床、経口摂取・嚥下訓練、脳卒中、心筋梗塞、大動脈解離、人工呼吸器離脱、呼吸理学療法などに係るリハビリテーション手順を再検討した上で、新たに早期離床・リハビリテーションプロトコルとして再構築した。また、早期離床・リハ計画書や実施内容・加算入力用テンプレートなどを整備し、2018/5 月より本格的な活動を開始した。

早期離床・リハビリテーション加算



ICU 看護師による早期離床・リハビリに関わる行為を評価して 500 点の加算が新設
1）専任チーム（基準を満たす医師・看護師・理学療法士）の設置
2）計画書の作成、 48 時間以内に取組開始、成果の定期的評価
3）プロトコルの整備と定期的見直し（偶数月に高機能病床運営委員会で討議）

早期離床・リハビリテーション計画書

1. 集中治療室入室申込書の 2 ページ目に早期離床・リハビリテーション計画書を設けた。
2. 氏名、診療科、診断名は自動入力。入室日時をクラークが記入。
3. 主治医名が入力された電子データをもって早期離床・リハ申込書とした（全例を対象）。
4. チームにて実際に行う行為にチェックを入れ、チームメンバー全員が署名したものを早期離床・リハ計画書とし、これに基づき早期離床・リハを実施する。



早期離床・リハビリテーションの流れ

ICU 入室申込書（主治医）
早期離床・リハビリテーション計画書
- 項目をチェック
- チームメンバーの署名
- スキャン（クラーク）

ウォーキングカンファレンス（9:15-10:00）
- 前日までの早期離床・リハの進捗状況の共有と評価
- 当日の早期離床・リハの予定確認

早期離床・リハビリテーション実施（午前・午後）
- 専任理学療法士と担当看護師

実施内容と成果の記事入力（CAP・電子カルテ）
加算入力（ICU 処置欄にポタン）

1. 入室後できるだけ早期にチームで検討した上で計画書を作成・署名し、入室後 48 時間以内に早期離床・リハを開始できた症例を加算対象とする。
2. 毎朝、多職種でカンファレンスを行い、前日までの進捗状況の共有と評価、及び当日の早期離床・リハの内容を確認し、専任理学療法士と担当看護師、内容によっては ICU 医師も参加し早期離床・リハを実施している。
3. 疾患別リハを同日に行うこともあるがその場合は点数の高い方のみを算定している。

取得可能日数と入院曜日・祝日の関係

1. 金曜の入室患者は、サイン済み計画書が作成できないため、加算がとれない。
2. 土曜の入室患者は、サイン済み計画書が月曜日に作成できれば、加算がとれる（8:30 以前の入室は取れない）。

毎朝の多職種カンファレンスと回診の様子

前日の早期リハと早期栄養について、多職種で確認・共有し、本日の計画を立てる
その後、ベッドサイドを回診し、患者さんが話せる場合は、感想やご希望を伺う

プロトコル（離床・床上運動）



リハ開始基準を満たす患者は、その意識レベルに応じて、床上運動もしくは離床ステップを進める。

ICU 活動度スケール（離床ステップ）

Level 10	自力歩行	
Level 9	介助歩行	
Level 8	Step（足踏み）	
Level 7	W/C（自力）	
Level 6	立位	
Level 5	臥位（何もされず）	
Level 4	W/C（全介助・要対もれ）	
Level 3	チェアポジション（足下無座位）	
Level 2	エルゴ、自動介助運動（ベッド上肢位・高負荷）	
Level 1	F-up、EMS（ベッド上肢位・低負荷）	
Level 0	ROM、体ドレ、G-up（ベッド上肢位・無負荷）	

プロトコル（人工呼吸器離脱・呼吸理学療法）


SBT 開始基準
1 呼吸不全の原因が改善傾向
2 PaF ≧ 200
3 PEEP ≦ 5
4 口腔・気道分泌物が多くない
5 吸反射が十分ある
6 心筋虚血のリスクが少ない
7 カテコラミン使用量が多くない
8 脳圧亢進状態ではない
9 意識が清明
10 医師が離脱可能と信じている
抜管困難のリスク評価
1 抜管困難の既往
2 開口困難、排管困難の既往
3 頸部の外傷、血腫、腫瘍
4 反回神経麻痺
5 SBT 失敗歴
6 慢性呼吸不全
7 咳嗽反射（飛水、服水、痰用）
8 水分過多（プラスバランス、浮腫）
9 長期挿管（48 時間以上）
10 太い挿管チューブ
喉頭浮腫リスク評価（カフリークテスト）
1 テストによる誤嚥を防ぐため、口腔、気管内、カフ上を十分に吸引する。
2 PC-AC（P-CMV）にモードを変更し、1 回換気量（Vt）を観察・記録する（連続 6 呼吸の平均を記録し、真ん中の 4 つの平均値を求める）。
3 気管チューブのカフを抜き、完全に虚脱させる。
4 連続 6 呼吸の 1 回換気量を観察・記録し、低い方から 3 つの平均値を V2 とする。
5 リーク量（V1 − V2）< 110 ml を、カフリークテスト陽性（喉頭浮腫の疑い）とする。
6 陽性の場合、抜管を延期し、ステロイド投与を行い、再度カフリークテストを行う。
抜管 12 時間前からヒドロコルチゾンソリ・ゲルエステル 100 mg を 4 時間毎に抜管直前まで計 4 回静注（12, 8, 4 時間前と直前）する。
自発呼吸トライアル（SBT, Spontaneous Breathing Trial）
1 Sport 5 ＋ 5 cmH₂O までウィーニング
2 サポート圧を 0 cmH₂O に下げ、3 分後、30 分後の下記の観察項目を評価し、呼吸補助がない状態に耐えられるかを定量的かつ客観的に確認する

F（回/分）	≦ 35 回/分	SpO_2（%）	≧ 90%
Vt（ml）	≦ 5 ml/kg	$EtCO_2$（mmHg）	Δ ≦ 10
RSBI（F/Vt）	≦ 100	BP（mmHg）	BPs 90-180、Δ < 30
pH	アシドーシスではない	HR（回/分）	HR < 140、Δ < 20%
$PaCO_2$（mmHg）	Δ ≦ 10	発汗	なし
PaO_2（mmHg）	≧ 80	努力呼吸	なし
P/F	≧ 200	精神状態	安定

3 30 分後に SBT 基準を満たしていたら速やかに抜管する

早期離床・リハの効果



人工呼吸器肺炎（VAP）予防バンドルに取り入れ、一定の成果が得られている。

早期リハ加算算定状況（2018/05 ～ 2024/12）



対象外となった症例数と要因



加算対象外となった症例は過去 7 年間の集計では 11.3% であったが、年々減少傾向にある。
加算対象外症例 5% 以下を目標とする

早期離床・リハの様子

① 寝たきり患者に対する EMS（電気骨格筋刺激）、② 補助具（シッタン）を用いた長時間の端座位保持、③ 歩行器（IVEA）と移動可能な人工呼吸器（モナール T60・Vivo 45LS, NKV）を用いた人工呼吸器患者に対する歩行、④ 看護師による水飲み試験、⑤ キットを用いた統一化プロトコルによる口腔ケアなどを展開している。

早期離床・リハチーム

スタッフのモチベーションも大いに上がっており、
多職種が一丸となって早期離床・リハに取り組んでいる。

考察と結論

1. 2024 年 12 月までの早期離床・リハの実施率は、85% であった。
2. 累積収益額は疾患別と合わせて 8315 万円、年間収益額は 1377 万円であった。
3. 早期離床・リハ加算が算定できなかった症例の割合（非算定率）は 11.2% と少なからず存在したが、年々減少傾向にある。
4. その要因として、週末連休中の入室のため 48 時間以内に計画・実施ができない（21%）、ICU 加算対象外（23%）、緊急入室翌日退室（11%）、入室日押出（11%）、チームが揃わない（8%）などであった。

COI 開示

筆頭発表者：岡本 竜哉

① 役員・顧問職等の報酬	無	⑥ 研究費・助成金など	無
② 株式の利益（または株式の5%以上）	無	⑦ 奨学（奨励）寄付金など	無
③ 特許権使用料など	無	⑧ 寄附講座所属	無
④ 講演料など	無	⑨ その他（旅費・贈答品など）	無
⑤ 原稿料など	無		